SYNDROME DE LA BANDELETTE ILIO-TIBIALE

- OU TENDINOPATHIE DU TFL OU
- "SYNDRÔME DE L'ESSUIE-GLACE"

- SFMSS 10/02/24

- Jean-Pierre Castiaux

TRACTUS ILIO-TIBIAL

- Tractus ilio-tibial :
 - fibres **ant** liées à l'aile lat pat et au bord lat patella → syndr sublux lat rotule

Tractus ilio-tibial :

- fibres **post.** s'insèrent au tuberculum ilio-tibialis et biceps fémoral → rôle de stabilisateur

Syndrôme de la friction de la bandelette ilio-tibiale

- Coureurs à pied +++
foot, cyclisme, ski,...

Compression/ tension ou **friction** entre la partie post de la bandelette ilio-tibiale et le condyle femoral latéral (tendinite ?) espace entre le bandelette et le tubercule de Gerdy est occupé une extension de la capsule+ recessus synovial latéral= **interface**

Bursite

Mécanisme du syndrome de la bandelette ilio-tibiale.

DIAGNOSTIC

- Anamnèse : entraînement excessif ou irrégulier
- Douleur précise et liée à la flexion répétitive surtout dans les 30° de flexion soit vie sportive et/ou vie courante
- Palpation+ avec douleur et/ou crépitation
- Test de Noble- Test de Renne- -test d'Ober

TYPES DE BLESSURES SELON LE STRESS APPLIQUÉ

Facteurs favorisants

- **Technopathie** pure: sol, chaussure, technique de course, profil du terrain,...
- Troubles **morphologiques** : ILMI, podologiques, genu varum/ valgum...
- **Raideur** musculaire ou **dysfonctionnement** articulaire du bassin (ratioABD/ADD), de la cheville
- Anomalies des plis et des recessus synoviaux, graisse

Diagnostics différentiels

Instabilité fémoro-patellaire

Tendinopathie biceps fémoral, poplité

Dysfonction de la tibio-fibulaire sup

Atteinte du LCL

Lesions chondrales

Lesions méniscales

Kyste arthro-synovial

TRAITEMENT

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

*RX : bassin –
scaniométrie*

ECHO : bursite

*IRM ou CTA : bilan
articulaire*

REPOS relatif (fréquence-répétitions)
AINS?

LOCAL : glace, gel, mésothérapie,
infiltration

KINESITHERAPIE, REEDUCATION

BILAN PODOLOGIQUE DYNAMIQUE

CHIRURGIE rare

Merci pour votre attention